

DOŠ Prosenjakovci
Prosenjakovci 97 c
9207 Prosenjakovci



KÁI, Pártosfalva
Pártosfalva 97 c
9207 Pártosfalva

Tel./faks: 02 544 10 30; 02 544 10 10; 544 12 80; 544 10 15; dos-prosenjakovci@guest.arnes.si

Datum: 11. 5. 2020

Št. dokumenta: 60309-4/2020/17

Zadeva: **IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC/ŠOLO ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19**

Moj otrok/učenec _____

(ime in priimek otroka/učenca)

1. v zadnjih 14 dneh ni imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav.
2. v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
3. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo otrok ostal doma.

Kraj in datum: _____

Ime, priimek enega od staršev/zakonitih zastopnikov: _____

Podpis staršev ali skrbnikov: _____

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni. Druženje otrok namreč poveča tveganje za okužbo otroka.

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: <https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov>

DOŠ Prosenjakovci
Prosenjakovci 97 c
9207 Prosenjakovci



KÁI, Pártosfalva
Pártosfalva 97 c
9207 Pártosfalva

Tel./faks: 02 544 10 30; 02 544 10 10; 544 12 80; 544 10 15; dos-prosenjakovci@guest.arnes.si

Keltezés: 2020. 5. 11.

Dokumentum szám: 60309-4/2020/17

Tárgy: "**SZÜLŐI NYILATKOZAT A GYERMEK ISKOLAKEZDÉSE/ÓVODAKEZDÉSE ELŐTT a COVID-19 terjedésének megfékezését célzó intézkedések felszabadításakor**"

Gyermekem/tanuló _____

(a gyermek/tanuló vezeték- és utóneve)

1. az elmúlt 14 napban nem voltak észlelhetők a következő tünet(ek): láz, köhögés, fejfájás, rossz közérzet, torokfájás, nátha, légszomj, hasmenés, ill. egészséges volt ebben az időszakban.
2. az elmúlt 14 napban nem volt kapcsolatban egyetlen olyan emberrel sem, aki megerősített SARS-CoV-2 fertőzéssel rendelkezik.
3. ha gyermekemnél a fenti tünetek alakulnak ki, vagy a SARS-CoV-2 fertőzés a gyermekkel ugyanabban a háztartásban élő személyben (általában egy családtagban) megerősítést nyer, akkor a gyermek otthon marad.

Hely és keltezés: _____

A szülő, ill. gyám vezeték- és utóneve: _____

A szülő, ill. gyám aláírása: _____

Ha gyermeke megbetegszik a fenti tünetek miatt, vagy a SARS-CoV-2 fertőzés a gyermekkel ugyanabban a háztartásban élő személyben (általában egy családtagban) megerősítést nyer, akkor otthon kell maradnia, és korlátoznia kell a kapcsolatot más emberekkel. Ha a gyermek beteg, hívja a gyermek választott vagy ügyeletes orvosát további utasításokért. Amennyiben a családban visszaigazolt fertőzés vagy más, a fertőzött személyhez szoros kapcsolat lép fel, további utasításokat kap a járványügyi szolgálattól.

Javasoljuk, hogy a gyermek korlátozza az idős emberekkel (pl. nagyszülőkkel) és a kapcsolódó krónikus betegségekkel vagy immunhiányos emberekkel való érintkezést, mivel ezek nagyobb mértékben vannak kitéve a betegség súlyos kimenetelének. A gyermekekkel való szocializáció növeli a gyermek fertőzésének kockázatát.

Alapinformációk a COVID 19-ről

A SARS-CoV-2 vírusfertőzés 2019. évi koronavírusbetegséget okozhat, avagy a COVID 19-et. Az inkubációs periódus (a fertőzés és a betegség kezdete között eltelt idő) akár 14 nap is lehet, átlagosan körülbelül 6 nap. A betegség leggyakrabban a légzőszervi fertőzés jeleivel / tüneteivel, azaz rossz közérzettel, fáradtsággal, náthával, lázzal, köhögéssel és súlyosabb formákban légszomjjal jár. A fertőzöttek 80% -ában a betegség enyhe. Gyermekekben a betegség lefolyása általában könnyebb, és a súlyos lefolyás és szövődmények kockázata növekszik időskorúakban (főleg 60 év felett) és társult betegségekkel, például szív- és érrendszeri betegségekkel, tüdő, máj, vese, cukorbetegség, immunrendszeri hiányosságok esetében stb. A betegség súlyosabb folyamatát tüdőgyulladás jellemzi. Mikrobiológiai vizsgálat szükséges a SARS-CoV-2 fertőzés megerősítéséhez vagy kizárásához. A SARS-CoV-2 fertőzést az emberek cseppek útján terjesztik, légzőszervi szekréciókon keresztül. A továbbításhoz szorosabb kapcsolat szükséges a beteggel (a beteg távolsága kevesebb, mint 1,5 m). A fertőzés szennyezett felületek érintkezése által is terjedhet. A következőket kéz- és köhögés higiénia tehát a legfontosabb a fertőzés megelőzéséhez. Részletes útmutatások a fertőzések megelőzéséhez és további információk a Nemzeti Közegészségügyi Intézet weboldalán: <https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov>